Das Original.
Jetzt bei InfectoPharm

Ritalin® Tabletten			
PZN	**Wirkstärke**	**Packungsgröße**	**AVP [€]**
1313646	10 mg	30 St.	9,80 €

Ritalin® LA Kapseln			
PZN	**Wirkstärke**	**Packungsgröße**	**AVP [€]**
3774251	10 mg	30 St.	30,20 €
2437899	20 mg	30 St.	40,25 €
2437907	30 mg	30 St.	49,40 €
3533978	40 mg	30 St.	63,65 €

Stand 01.07.2022

Diese Broschüre ist nur für Fachkreise bestimmt.

1 Haertling F, Mueller B, Bilke-Hentsch O. Effectiveness and safety of a long-acting, once-daily, two-phase release formulation of methylphenidate (Ritalin® LA) in school children under daily practice conditions. Atten Defic Hyperact Disord. 2015;7(2):157-164. **2** AWMF-Leitlinie Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, Registernummer 028-045, Stand: Mai 2017. **3** Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, Mohr-Jensen C, Hayes AJ, Carucci S, Atkinson LZ, Tessari L, Banaschewski T, Coghill D, Hollis C, Simonoff E, Zuddas A, Barbui C, Purgato M, Steinhausen HC, Shokraneh F, Xia J, Cipriani A. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a sys-tematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018 Sep;5(9):727-738. **4** Ritalin LA Clinical Overview in pediatric ADHD, Novartis, Juni 2014. **5** Haessler F, Tracik F, Dietrich H, Stammer H, Klatt J. A pharmacokinetic study of two modified-release methylphenidate formulations under different food conditions in healthy volunteers. Int J Clin Pharmacol Ther. 2008 Sep;46(9):466-76. **6** Schulz E, Fleischhaker C, Hennighausen K, Heiser P, Haessler F, Linder M, Stollhoff K, Warnke A, Baier M, Klatt J. A randomized, rater-blinded, crossover study comparing the clinical efficacy of Ritalin(®) LA (methylphenidate) treatment in children with attention-deficit hyperactivity disorder under different breakfast conditions over 2 weeks. Atten Defic Hyperact Disord. 2010 Nov;2(3):133-8. **7** Lee L, Kepple J, Wang Y, Freestone S, Bakhtiar R, Wang Y, Hossain M. Bioavailability of modified-release methylphenidate: influence of high-fat breakfast when administered intact and when capsule content sprinkled on applesauce. Biopharm Drug Dispos. 2003 Sep;24(6):233-43.

Ritalin® 10 mg Tabletten/Ritalin® LA 10/20/30/40/60 mg Kapseln. Qualitative und quantitative Zusammensetzung: 1 Tabl. enth. 10 mg Methylphenidat Hydrochlorid/1 Kapsel enth. 10/20/30/40/60 mg Methylphenidat Hydrochlorid. **Sonstige Bestandteile:** Gelatine, Talkum. Ritalin Tabl.: Magnesiumstearat, Calciumphosphat. 1 Tabl. enth. 40 mg Lactose und 48 mg Weizenstärke. Ritalin LA: Ammoniummethacrylat-Copolymer, Methacrylsäurecopolymer Typ A/ Methacrylsäure-methacrylate Copolymer, Macrogol, Maisstärke, Triethylcitrat. Ritalin LA 10/20/30/40/60 mg Kapseln enthalten 56,17 mg, 112,33 mg, 168,50 mg, 224,66 mg und 337 mg Saccharose pro Kapsel. Zusätzl. in Ritalin LA 10/20/30/40: Titandioxid (E171). Zusätzl. in Ritalin LA 10/40: rotes Eisenoxid (E172), gelbes Eisenoxid (E172). Zusätzl. in Ritalin LA 10 mg: Eisenoxid schwarz (E172), braune Drucktinte. Zusätzl. in Ritalin LA 30: gelbes Eisenoxid (E172). Zusätzl. in Ritalin LA 60: Zuckerkügelchen. Kapselhülle LA 60 mg: Schwarzes Eisenoxid (E172), rotes Eisenoxid (E172), gelbes Eisenoxid (E172), Titandioxid (E171), Gelatine. Drucktinte: dehydrierter Alkohol, Butylalkohol, Eisenoxid rot (E172), Eisenoxid gelb (E172), Isopropylalkohol, Kaliumhydroxid, Propylenglycol, ger. Wasser, Schellack, Ammoniumlösung, Titandioxid (E 171). Zusätzl. in Drucktinte 10 mg LA: Eisenoxid schwarz (E172). **Anwendungsgebiete:** Ritalin Tabl. u. Ritalin LA 10/20/30/40/60: i. R. einer therapeut. Ges.strategie zur Behandl. von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störungen (ADHS) b. Kindern ab einem Alter v. 6 J., wenn sich andere therapeut. Maßn. allein als unzureichend erwiesen haben; Ritalin LA 10/20/30/40/60 mg: i. R. einer therapeut. Ges.strategie zur Behandlung von ADHS bei Erw. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichk. gg. d. Wirkst. od. einen d. sonst. Bestandt., Glaukom, Phäochromozytom, während d. Behandl. mit MAO-Hemmern od. innerhalb v. mind. 14 T. nach Absetzen solcher Substanzen, Hyperthyreose od. Thyreotoxikose, Diag. od. Anamn. v. schw. Depr., Anorexia nerv./anorekt. Stör., Suizidneig., psychot. Sympt., schw. affekt. Stör., Manie, Schizophr., psychopath./ Borderline-Persönlichkeitsstör., Diagn. od. Anamn. v. schw. u. episod. (Typ I) bipol. affekt. Stör., vorbest. Herz-Kreislauferkr., einschl. schw. Hypertonie, Herzinsuff., art. Verschlusskrankh., Angina pec., hämodyn. signifik., angeb. Herzfehler, Kardiomyopathien, Myokardinf., pot. lebensbedroh. Arrhythmien u. Kanalopathien, vorbest. zerebrovaskul. Erkrank., wie z. B. zerebrale Aneurysmen, Gefäßanomalien einschl. Vaskulitis od. Schlaganfall. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Psychoanaleptika, Psychostimulanzien, Mittel zur Behandlung der ADHS und Nootropika, zentral wirkende Sympathomimetika, Methylphenidat. ATC-Code: N06BA04. **Packungsgrößen:** Ritalin Tabl: 30 Tabl.; Ritalin Kapseln: 30 Kapseln. **Inhaber der Zulassung:** INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH, Von-Humboldt-Str. 1, D-64646 Heppenheim. **Suchtgift, Abgabe nur auf Suchtgiftrezept, apothekenpflichtig.** Stand 06/2022. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

F8001978-01-0622

Vertrieb: INFECTOPHARM · Arzneimittel und Consilium GmbH
Von-Humboldt-Straße 1 · D-64646 Heppenheim.

Kontakt: InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2 / 1. Stock / Stiege 2 · 1190 Wien
Telefon 01/227 60 65-6060 · Fax 01/227 60 65-6061
www.infectopharm.at · austria.kontakt@infectopharm.com

Un+onzen=riert?

Endlich Struktur im Kopf

Ritalin® LA

Methylphenidathydrochlorid

- → **A**uch ohne Nahrung einnehmbar[1]
- → **D**ie leitliniengerechte Therapie[2]
- → **H**öchste Wirksamkeit bei der Kernsymptomatik[3]
- → **S**ichere und innovative Retard-Galenik

INFECTOPHARM
Wissen wirkt.

Der Goldstandard bei ADHS

Der Wirkstoff der ersten Wahl bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS ist und bleibt Methylphenidat:

- evidenzbasiert und gestützt auf große Meta-Analysen[3]
- und entsprechend den Empfehlungen der aktuellen Leitlinie[2]

> „Die initiale Behandlung mit zugelassenen Amphetaminpräparaten […] ist außerhalb der Zulassung, wenn initial kein Behandlungsversuch mit Methylphenidat erfolgt war."[2]

Innovative Freisetzungskinetik

Die Ritalin® LA-Hartkapseln enthalten zwei Pelletsorten, welche sich hinsichtlich des Aufbaus ihrer Schichten und ihrer Funktion unterscheiden.

50 % der Pellets geben den Wirkstoff unmittelbar frei („immediate release", IR), 50 % setzen den Wirkstoff 3-4 Stunden nach Einnahme frei („extended release", ER).



Kontinuierliche Wirkspiegel

Die Freisetzungskinetik von Ritalin® LA imitiert intelligent die zweimalige Einnahme von unretardiertem Methylphenidat im Abstand von 4h.[4]



Es werden gleichbleibende, langanhaltende Wirkspiegel erzielt, wodurch die Notwendigkeit einer zweiten Dosis am Mittag entfällt.

Der robuste Freisetzungsmechanismus aus den Pellets wird durch schwankende pH-Werte im Gastrointestinaltrakt oder durch Nahrung nicht beeinflusst und liefert sicher das gewünschte biphasische Plasmaspiegelprofil.[5]

Nahrungsmittelunabhängigkeit

Die flexible Einnahme von Ritalin® LA, die unabhängig von einer Mahlzeit erfolgt, schafft Therapiesicherheit für Ihre Patienten und bietet diesen eine einfache und verlässliche Möglichkeit, die Medikation individuell in die Tagesroutine einzubauen. Dabei können Sie sich immer auf Ritalin® LA verlassen:

- Die Bioverfügbarkeit und die besondere Freisetzungskinetik sind unabhängig von einer Mahlzeit[5,6]
- Sichere klinische Wirksamkeit – nahrungsmittelunabhängig[6]
- Dose-Dumping-Effekt auch bei fettreichen Mahlzeiten ausgeschlossen[7]

Kinetik und Galenik fördern eine hohe Therapie-Adhärenz

- Einfach – nur 1x täglich morgens einzunehmen
- Sicher – Einnahme auch auf nüchternen Magen möglich[1]
- Flexibel – bei Schluckproblemen können die Kapseln geöffnet und die Pellets in eine Speise eingerührt werden